Réseau francilien PRED-IdF

Syndrome de Peutz-jeghers (2)

Dépistage systématique, quelles que soient les caractéristiques de l'histoire familiale

Organe	Méthode ¹	Début	Intervalle
Sein	 Examen clinique annuel IRM mammaire + mammographie ± échographie mammaire² 	Début Cs gynéco 30 ans 30 ans	/ 1 an / 1 an / 1 an
Col utérin (adenoma malignum)	Examen cliniqueFrottis cervico-vaginaux	Début Cs gynéco Début Cs gynéco	/ 1 an / 1 an
Ovaires (T cordons sexuels avec tubules annelés ++) Endomètre	Examen cliniqueEchographie endovaginale	25 ans 25 ans	/ 1 an / 1 an
Chirurgie prophylactique gynécologique	 Chirurgie prophylactique mammaire discutable au cas par cas (RCP) Chirurgie prophylactique gynécologique (Hystérectomie totale + annexectomie bilatérale) à partir de 45 ans, discutable au cas par cas (RCP) 		
Testicules	Examen cliniqueEchographie testiculaire	De 8 à 20 ans De 8 à 12 ans	/ 1 an / 1 an

- 1 Se reporter aux documents spécifiques relatifs aux critères de qualité des différents examens
- 2 Par analogie aux recommandations des femmes avec mutation germinale BRCA 1/2