Réseau francilien PRED-IdF

Syndrome de Cowden*

Dépistage systématique, quelles que soient les caractéristiques de l'histoire familiale

Organe		Début	Intervalle
Colon/rectum	Coloscopie (+/- chromoendoscopie pancolique à l'indigo carmin ?)	30 - 35 ans ?	2 - 3 ans?
Estomac	Endoscopie OGD	Au moment de la première coloscopie	2 - 3 ans?
Intestin grêle	• VCE	Au moment de la première coloscopie	2 – 3 ans?
Sein si mastopathie modérée	Examen clinique mammaire ± échographie Mammographie + IRM mammaire	25 30 (ou 5 ans avant le plus jeune cas de cancer familial)	/1 an /1an
Sein si mastopathie majeure	 Examen clinique + IRM mammaire ± échographie Mammographie Mastectomie bilatérale prophylactique 	Dès 15 ans 30 ans 25-30 ans	/1 an
Endomètre	Echographie pelvienne endovaginale	35-40 ans (ou 5 ans avant le plus jeune cas de cancer familial)	/1 an
Thyroide	Echographie thyroidienne	18 ans	/1 an
Peau	Examen dermatologique	Dès le diagnostic	/1 an

^{*}Confirmé avec mutation PTEN

20